




# ยารา

ความรู้ปลูกแรงบันดาลใจ

## โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับมังคุด



ระยะฟื้นต้นหลัง  
เก็บเกี่ยวผลผลิต

แตกใบอ่อนชุดที่ 2,3

ระยะสะสมอาหาร

ระยะติดผลเล็ก

ระยะสร้างเนื้อ พริกลูก



**ยารามีร่า**  
**16-16-16**  
1 กก./ต้น

+



**ยาราลีว่า**  
**ไนโตรบอร์**  
**15-0-0**  
0.5 กก./ต้น



**ยารามีร่า**  
**16-16-16**  
1 กก./ต้น



**ยารามีร่า**  
**ดับเบิล**  
**8-24-24+TE**  
1 กก./ต้น



**ยารามีร่า**  
**วินเนอร์**  
**14-8-19+TE**  
1 กก./ต้น

+



**ยาราลีว่า**  
**ไนโตรบอร์**  
**15-0-0**  
0.5 กก./ต้น



**ยารามีร่า**  
**ท็อปเค**  
**10-10-30+TE**  
1 กก./ต้น

หรือ



**ยารามีร่า**  
**วินเนอร์**  
**14-8-19+TE**  
1 กก./ต้น

ข้อความสำคัญ \* TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีร่า ดับเบิล ได้แก่ เหล็ก, สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส  
TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีร่า วินเนอร์ ได้แก่ สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส  
TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามีร่า ท็อปเค ได้แก่ โบรอน  
โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยน  
ไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก



ติดต่อเรา



ยารา ประเทศไทย  
www.yara.co.th  
ยารา ประเทศไทย

สั่งซื้อได้เลยที่  
**ฟาร์มแคร์**

