




ยารา

ความรู้ปลูกแรงบันดาลใจ

โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับส้มโอ



ระยะหลังเก็บเกี่ยวฟื้นฟูสภาพต้น

ระยะก่อนติดดอก

ระยะบำรุงผล



ยารามิรา 16-16-16
1 กก./ต้น/เดือน
(ใช้ 2 ครั้งทุกๆ 30 วัน)



ยารามิรา วินเนอร์ 14-8-19+TE
1 กก./ต้น/เดือน

+



ยาราลีวา ไนโตรบอร์ 15-0-0
0.5 กก./ต้น/เดือน



ยารามิรา วินเนอร์ 14-8-19+TE
1 กก./ต้น/เดือน
(ใช้ 5-6 ครั้งทุกๆ 30 วัน)

+



ยาราลีวา ไนโตรบอร์ 15-0-0
0.5 กก./ต้น/เดือน
(ใช้ 5-6 ครั้งทุกๆ 30 วัน)

ข้อความสำคัญ * TE หรือจุลธาตุในปุ๋ยยารามิรา วินเนอร์ ได้แก่ สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน, ภูมิอากาศ, สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก



ติดต่อเรา



ยารา ประเทศไทย
www.yara.co.th
ยารา ประเทศไทย

สั่งซื้อได้เลยที่ **ฟาร์มแคร์**

